




J.U. ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO KANTONA
SARAJEVO



P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC
HEALTH OF CANTON
SARAJEVO

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

ZAŠTITA ZDRAVSTVENIH RADNIKA
I SARADNIKA OD INFKECIJE IZVAZVANE
VIRUSOM SARS-CoV-2 (oboljenja COVID-19)



VAŽNE NAPOMENE!

- Samo postojanje lične zaštitne opreme nije dovoljno za sprječavanje infekcije zdravstvenih radnika i saradnika virusom SARS-CoV-2.
- Lična zaštitna oprema može biti izvor infekcije kod nepravilne upotrebe.
- Od ključnog značaja je PRAVILNA UPOTREBA LIČNE ZAŠTITNE OPREME (LZO), odnosno uvježbanost i kompetentnost pri njenom stavljanju i skidanju.



Lična zaštitna oprema za rad na terenu, van zdravstvene ustanove

Za članove tima za ispitivanje osoba sasumnjom/potvrđenim COVID-19 i njihovim kontaktima

- Uzimanje epidemiološke ankete od osoba sa sumnjom ili potvrđenim COVID-19 ili od njihovih kontakata (preporučuje se telefonom): LZO nije potrebna
- Uzimanje epidemiološke ankete od osoba sa sumnjom ili potvrđenim COVID-19 na terenu: održavati rastojanja od najmanje 1 metar, ne dodirivati površine u kući/stanu, hirurška maska, zaštitni mantil za jednokratnu upotrebu, rukavice, zaštitne naočale
- Uzimanje brisa za mikrobiološko testiranje: partikularna maska FFP3, nepromočiv mantil/nepromočiv kombinezon, rukavice, zaštitne naočale ili vizir
- Uzimanje epidemiološke ankete od zdravih osoba iz kontakta oboljelog i bez kontaktno mjerjenje tjelesne temperature: održavanje rastojanja od najmanje 1m, ne dodirivati površine u kući/stanu, hirurška maska, zaštitni mantil za jednokratnu upotrebu, rukavice, zaštitne naočale

Za osobe sa sumnjom/potvrđenim COVID-19: hirurška maska




Lična zaštitna oprema za lica u vozilu za prevoz mogućeg slučaja COVID-19

- **Za zdravstvenog radnika:** partikularna maska (FFP2), nepromočiv mantil/nepromočiv kombinezon, zaštitne naočale/vizir, rukavice, sredstvo za higijenu ruku
- **Za vozača:** Udaljenost od bolesnika bar 1metar: posebna LZO nije potrebna;
- **Pomoć pri unošenju/iznošenju pacijenta:** partikularna maska (FFP2), zaštitni mantil za jednokratnu upotrebu, zaštitne naočale/vizir, rukavice, sredstvo za higijenu ruku
- **Za bolesnika:** hirurška maska
- **Za pomoćnog radnika za higijenu (pranje i čišćenje saniteta poslije prevoza bolesnika):** hirurška maska, zaštitni mantil/kecelja, gumene, dugačke rukavice, čizme ili zatvorene radne cipele



Lična zaštitna oprema za lica u domovima zdravlja (1)

- **Trijažni boks/šalter na ulazu** (pružanje informacije, dodavanje maske):
- *Za zdravstvenog radnika u trijažnom boksu sa staklenom pregradom:* LZO nije potrebna
- *Za zdravstvenog radnika u trijažnom boksu sa otvorenim pultom:* održavati rastojanje od najmanje 1 metar, hirurška maska



Lična zaštitna oprema za lica u domovima zdravlja (2)

U ambulanti za trijažu (ordinacija za pregled bolesnika izdvojenih na trijažnom šalteru):

- *Za zdravstvenog radnika* (pregled, pacijenta sa sumnjom na COVID-19): hirurška maska, zaštitni mantil za jednokratnu upotrebu, rukavice, zaštitne naočare
- *Za bolesnik SA respiratornim simptomima*: održavati rastojanje od najmanje 1 metar, hirurška maska
- *Za bolesnik BEZ respiratornih simptoma*: LZO nije potrebna
- *Za uzorkovača biološkog materijala*: partikularna maska FFP3, nepromočiv mantil/nepromočiv kombinezon, rukavice, zaštitne naočale ili vizir
- *Za pomoćnog radnika za higijenu*: hirurška maska, zaštitni mantil/kecelja za jednokratnu upotrebu, gumene rukavice, zaštitne naočale, zatvorene radne cipele



Lična zaštitna oprema za lica u domovima zdravlja (3)

U čekaonicama:

- **Za bolesnika SA respiratornim simptomima:** hirurška maska;
- Što hitnije izdvojiti pacijenta u izdvojenu prostoriju (čekaonicu, ordinaciju)
- Ukoliko to nije moguće, obezbijediti rastojanje od najmanje 1 metar od ostalih pacijenata
- Alternativno, pacijent sa sumnjom na COVID-19 može čekati napolju sa maskom i rastojanjem od 1 metar od drugih osoba, ili može čekati u svojom autu dok ga ne pozovu telefonom kada dođe na red
- **Za bolesnika BEZ respiratornih simptoma:** LZO nije potrebna

U mikrobiološkoj laboratoriji: partikularna maska FFP3, nepromočiv mantil/nepromočiv kombinezon, sterilne rukavice, zaštitne naočale ili vizir

U drugim područjima tranzita pacijenata (odjeljenja, hodnici): LZO nije potrebna


U administrativnom dijelu: LZO nije potrebna



Lična zaštitna oprema u bolnicama (1)

Trijažni boks/šalter na ulazu (pružanje informacije, dodavanje maske):

- Za zdravstvenog radnika u trijažnom boksu sa staklenom pregradom: LZO nije potrebna
- Za zdravstvenog radnika u trijažnom boksu sa otvorenim pultom: održavati rastojanje od najmanje 1m, hirurška maska



Lična zaštitna oprema u bolnicama (2)


U ambulanti za trijažu

- Za zdravstvenog radnika, preliminarni pregled bez direktnog kontakta: održavati prostornu udaljenost najmanje 1m, LZO nije potrebna
- Za pacijente SA respiratornim simptomima: održavati rastojanje od najmanje 1m, hirurška maska
- Za pacijente BEZ respiratornih simptoma: LZO nije potrebna

U mikrobiološkoj laboratoriji: manipulacija sa uzorcima respiratornog trakta: partikularna maska FFP3, nepromočiv mantil/kombinezon, sterilne rukavice, zaštitne naočale/vizir

U administrativnom dijelu: LZO nije potrebna

U drugim područjima tranzita pacijenata (odjeljenja, hodnici): LZO nije potrebna



Lična zaštitna oprema u bolnicama (3)

U sobama za izolaciju

- Za zdravstvenog radnika, pomoćno osoblje i sva druga lica za koje je neophodan ulazak: kompletna oprema prema dalje navedenim slajdovima stavljanja i skidanja LZO
- *napomena: za procedure sa produkcijom aerosola koristiti partikularne maske FFP3, u ostalim slučajevima maske FFP2

Lična zaštitna oprema


- Hirurške maske
- Partikularne maske visokog procenta filtracije (evropske norme FFP2 ili FFP3)
- Zaštita za oči (zaštitne naočale) ili zaštita za lice (vizir), da bi se izbjegla kontaminacija mukoznih membrana
- Vodootporni nesterilni zaštitni mantili dugih rukava (ili kombinezon-skafander)
- Rukavice





Postupci pri stavljanju lične zaštitne opreme (LZO)

- Urediti prostor za oblačenje LZO ispred sobe za izolaciju osobe sa sumnjom na infekciju ili potvrđenim slučajem COVID-19 oboljenja (izazvanim virusom SARS-CoV-2).
- Uvijek staviti LZO pri kontaktu sa osobom sa sumnjom na infekciju izazvanu virusom SARS-CoV-2, ili potvrđenim slučajem COVID-19 oboljenja.
- Stavljanje i skidanje LZO treba UVIJEK obavljati u prisustvu mdruge, za tu proceduru uvježbane osobe.
- Staviti LZO prije ulaska u sobu za izolaciju (u prostoru za oblačenje).



STAVLJANJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME



Stavljanje lične zaštitne opreme

Postupci prije ulaska u sobu za izolaciju

- 1. Obaviti higijenu ruku sredstvom na bazi alkohola**
- 2. Obući vodootporni zaštitni mantil dugih rukava (ili kombinezon)**
- 3. Staviti kapu ukoliko se nosi mantil**
- 4. Staviti masku (partikularnu ili hiruršku)**
- 5. Staviti zaštitne naočale**
- 6. Navući kapuljaču ukoliko se nosi kombinezon**
- 7. Obaviti higijenu ruku sredstvom na bazi alkohola**
- 8. Navući rukavice**

1. Higijena ruku

Obaviti higijenu ruku sredstvom na bazi alkohola

(prema nacionalnim preporukama za higijenu ruku).






2a. Obući vodootporni zaštitni mantil dugih rukava (ili kombinezon)

Zatvaranje vodootpornog mantila pomaže
osoba koja nadgleda oblačenje





2b. Oblačenja nepromočivog zaštitnog kombinezona

- Navući rukave kombinezona;**
- Zatvoriti rajfešlus do kraja.**





3. Staviti kapu

- Staviti kapu ukoliko je obučen vodootporni zaštitni mantil
- Kapa treba u potpunosti da prekriva kosu (koja je prethodno skupljena, ukoliko je duga)






4. Staviti masku

Hirurška maska se koristi:

- Prilikom trijaže i ranog otkrivanja izvora infekcije, kao standardna mjera predostrožnosti
- Kod pacijenta sa simptomima i znacima infekcije od strane respiratornog trakta
- Kod pacijenta kada napušta sobu za izolaciju u cilju izvođenja dijagnostičkih procedura

Partikularna maska se koristi:


- Kod zdravstvenih radnika i saradnika u sobi za izolaciju (FFP2)
- Kod procedura sa produkcijom aerosola (FFP3)



4a. Stavljanje partikularne maske

- Pravilno staviti partikularnu masku
(prema preporukama: gornja traka maske – preko tjemena; donja – ispod ušiju);
- Ojačani dio maske oblikovati prema nosu.





4a. Stavljanje partikularne maske

- Isti je postupak stavljanja maske ako je obučen kombinezon





4b. Uraditi test prijanjanja partikularne maske

Uraditi pozitivni i negativni test prijanjanja partikularne maske:

- *Pozitivni test prijanjanja: Izdahnite jako. Pozitivan pritisak unutar partikularne maske = vazduh ne izlazi sa strane. Ako osjetite da vazduh izlazi sa strane, podešite položaj maske i/ili bolje namjestite trake. (prema preporukama).*
- *Negativni test prijanjanja: Udahnite duboko. Ako vazduh ne ulazi sa strane, negativan pritisak će partikularnu masku privući uz lice.*



Pozitivni test prijanjanja



Negativni test prijanjanja



Kako koristiti hiruršku masku?

- Preko nosa, usta i brade
- Fiksirati masku u korijenu nosa
- Vezati je na potiljku i vratu
- Provjeriti da li maska dobro prijanja uz lice
- Maska se mijenja kada ovlaži





5. Stavljanje zaštitnih naočala


- Staviti zaštitne naočale koje štite od prskanja tjelesnih tečnosti/ respiratornog sekreta, sa slepočnim dijelom ili trakom
- Ili staviti vizir





Stavljanje vizira






5. Stavljanje zaštitnih naočala/vizira


- Istim postupkom staviti zaštitne naočale/vizir ako je obučen kombinezon





6. Obaviti higijenu ruku sredstvom na bazi alkohola






7. Navući rukavice

- Stavljaju se nesterilne ili sterilne rukavice u zavisnosti od očekivanih postupaka





SKIDANJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME



SKIDANJE LIČNE ZAŠTITNE OPREME

Obaviti u predprostoru sobe za izolaciju koji mora da bude opremljen kantom/kesom za infektivni otpad

1. Skinuti rukavice
2. Obaviti higijenu ruku i staviti novi par rukavica
3. Skinuti zaštitni mantil/kombinezon
4. Dezinfikovati rukavice
5. Skinuti naočale
6. Skinuti masku (partikularnu ili hiruršku)
7. Skinuti kapu, rukavice
8. Obaviti higijenu ruku


1. Skinuti rukavice


Prije započinjanja skidanja rukavica OBAVEZNO ih dezinfikovati sredstvom na bazi alkohola postupcima kao kod higijene ruku (osoba koja pomaže pri skidanju LZO dozira sredstvo)



1a. Kako skinuti rukavice?


- Uhvatiti spoljnu ivicu blizu ručnog zgloba
- Skinuti je sa ruke, okrećući unutrašnju stranu spolja
- Staviti je u suprotnu ruku na kojoj je još uvijek rukavica





1b. Kako skinuti rukavice?

- Uvući prst „oslobodjene“ ruke ispod druge rukavice u blizini ručnog zgloba
- Skinuti je, okrećući unutrašnju stranu spolja praveći „paket“ od obje rukavice
- Odložiti „paket“ pravilno



A blue-toned microscopic image showing several cells with visible nuclei and cellular structures, serving as a background for the top-left corner of the slide.

2.Higijena ruku i stavljanje novog para rukavica

Poslije skidanja rukavica:

- Obaviti higijenu ruku sredstvom na bazi alkohola
- Staviti novi par rukavica, kako bi se završio postupak skidanja LZO

3. Skidanje vodootpornog zaštitnog mantila


- Osoba koja pomaže otkopčavanju mantila nosi rukavice
- Skinuti mantil tako da se ne dodiruje spoljašnji, kontaminirani dio i da on ostane savijen unutra
- Odložiti mantil u kantu/kesu za infektivni otpad



3. Skidanje zaštitnog kombinezona

- Kombinezon polako i pažljivo skidati od kapuljače do nogavica, uvijanjem tako da unutrašnja, čista strana ostane spolja.
- Partikularna maska, naočale ili vizir su i dalje na licu





4. Dezinfekcija rukavica


- Prije započinjanja skidanja naočala i maske, obaviti dezinfekciju rukavica sredstvom na bazi alkohola



5. Skidanje naočala

- **Palcem i kažiprstom obuhvatiti sljepoočni dio naočala ili traku i odložiti ih u kesu za infektivni otpad ili u kontejner za dezinfekciju**






6. Skidanje partikularne maske

- Ne dodirivati spoljašnju stranu maske;
- Koristeći obje ruke, uhvatiti donju traku i prebaciti je naprijed preko glave;
- Skinuti masku prebacivanjem gornje trake preko glave;
- Odložiti masku u žutu kesu za infektivni otpad.




7. Skinuti kapu, rukavice, obaviti higijenu ruku

1




Uhvatiti spolinu ivicu rukavice blizu ručnog zoloba. Skinuti je sa ruke, okrećući unutrašnju stranu spolia, tako da spoliašnja površina ostane unutra.

2



Držati skinutu rukavicu u šaci sarukavicom. Prste šake bez rukavice uvući između rukavice i zglobova šake. Skinuti drugu rukavicu, okrećući unutrašnju stranu spolia, tako da bude navučena preko već skinute rukavice.

3



Odrožiti skinute rukavice u kesu/kantu za infektivni otpad.



Pravilna higijena ruku

Higijensko utrljavanje u ruke


Trajanje postupka 30 sekundi



Higijensko pranje ruku

Trajanje postupka 40-60 sekundi





Izvori:

- ECDC. Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm, February 2020.
- WHO. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Interim guidance, 25 January 2020.
- WHO. Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Interim guidance 27 February 2020.
- <http://www.pliva-sept.hr/higijena-ruku.html>